

**EVALUATIEFORMULIER REANIMATIE VAN EEN BABY (0 - 12 maanden) DOOR EEN HULPVERLENER / AMBULANCIER**

Naam kandidaat:

Dienst / Korps:

AMBULANCIER A (= cursist / kandidaat)		
		Score
Zorg voor veiligheid	Toont zorg voor veiligheid	-5
Controle bewustzijn	Aanspreken + schouders schudden of stimuleren aan handen of voetjes	-5
Bevestiging MUG	Feedback met AMB B	-10
	Tss controle bewustzijn en ten laatste na controle AH	-10
Vrije luchtweg	Hoofd in neutrale positie	-10
	Kinlift	-10
Controle ademhaling	Kijken, voelen luisteren (min. 5" en max. 10")	-55
Bevestiging REA	Feedback met AMB B	-5
5 initiële beademingen	Correcte positionering masker met één-hand-techniek	-10
MET BEADEMINGSBALLON! Indien > 50% correct = geslaagde beademing; indien < 50% correct = -10 punten	Hoofd in neutrale positie + kinlift	
	Correcte duur (rustig, 1"), 5 beademingen in totaal	
	Correct volume	
	Borstkas komt omhoog	
Controle tekenen van leven	Ademen, bewegen, hoesten; max. 10"	-10
2 beademingen	Correcte positionering masker met één-hand-techniek	-10
MET BEADEMINGSBALLON! Indien > 50% correct = geslaagde beademing; indien < 50% correct = -10 punten	Hoofd in neutrale positie + kinlift	
	Correcte duur (rustig, 1"), 2 beademingen in totaal	
	Correct volume	
	Borstkas komt omhoog	
Wissel AMB A - AMB B	Vlotte wissel na 2 minuten	-5

AMBULANCIER B (= examiner / figurant)		
Bevestigt dat MUG onderweg is		
Borstcompressies	2 vinger- of 2 duimsmethode, één vinger boven de processus xyphoïdeus Borstkas wordt 1/3 ingedrukt 15x na elkaar Frequentie van 100 / min. (max. 120 / min.)	

AMBULANCIER A (= examiner / figurant)		
2 beademingen	Correcte positionering masker met één-hand-techniek Hoofd in neutrale positie + kinlift Correcte duur (rustig, 1"), 2 beademingen in totaal Correct volume	
2 beademingen	Correcte positionering masker met één-hand-techniek Hoofd in neutrale positie + kinlift Correcte duur (rustig, 1"), 2 beademingen in totaal Correct volume	
2 beademingen	Correcte positionering masker met één-hand-techniek Hoofd in neutrale positie + kinlift Correcte duur (rustig, 1"), 2 beademingen in totaal Correct volume	

Wissel met AMBULANCIER A		
AMBULANCIER B (= cursist / kandidaat)		
		Score
Borstcompressies	2 vinger- of 2 duimsmethode, één vinger boven de processus xyphoïdeus Correcte houding / vingers worden niet verplaatst Borstkas wordt 1/3 ingedrukt 15x na elkaar Borstkas voldoende laten ontspannen Frequentie van tussen 100 en 120 / min	*
	* Indien 1x fout = - 15 punten, indien 2x fout = - 40 punten (= -55 punten => niet geslaagd)	
Borstcompressies	2 vinger- of 2 duimsmethode, één vinger boven de processus xyphoïdeus Correcte houding / vingers worden niet verplaatst Borstkas wordt 1/3 ingedrukt 15x na elkaar Borstkas voldoende laten ontspannen Frequentie van tussen 100 en 120 / min	*
	* Indien 1x fout = - 15 punten, indien 2x fout = - 40 punten (= -55 punten => niet geslaagd)	
Borstcompressies	2 vinger- of 2 duimsmethode, één vinger boven de processus xyphoïdeus Correcte houding / vingers worden niet verplaatst Borstkas wordt 1/3 ingedrukt 15x na elkaar Borstkas voldoende laten ontspannen Frequentie van tussen 100 en 120 / min	*
	* Indien 1x fout = - 15 punten, indien 2x fout = - 40 punten (= -55 punten => niet geslaagd)	
Borstcompressies	2 vinger- of 2 duimsmethode, één vinger boven de processus xyphoïdeus Correcte houding / vingers worden niet verplaatst Borstkas wordt 1/3 ingedrukt 15x na elkaar Borstkas voldoende laten ontspannen Frequentie van tussen 100 en 120 / min	*
	* Indien 1x fout = - 15 punten, indien 2x fout = - 40 punten (= -55 punten => niet geslaagd)	

Einde van de evaluatie na 2 minuten borstcompressies door cursist / kandidaat

Opmerkingen :

Punten: ..... / 100

GESLAAGD

NIET GESLAAGD

Evaluator 1

Naam en handtekening

Evaluator 2

Naam en handtekening

