

## EVALUATIEFORMULIER REANIMATIE VAN EEN BABY (0-12 maanden) DOOR EEN HULPVERLER/AMBULANCIER (BRC 2015)

HULPVERLENER/AMBULANCIER A (= kandidaat)				HULPVERLENER/AMBULANCIER B (= examiner)	
		Score			
Zorg voor veiligheid	Toont zorg voor veiligheid	<input type="checkbox"/>	-5		
Controle bewustzijn	Luid aanspreken – zachtjes schouders schudden	<input type="checkbox"/>	-5		
Bevestiging MUG	Feedback met H/A B (bewusteloze baby)	<input type="checkbox"/>		Bevestigt dat MUG onderweg is	
Vrije luchtweg	Hoofd in neutrale positie (sniffing position) – kinlift	<input type="checkbox"/>	-20		
Controle ademhaling	Kijken – voelen – luisteren (min. 5", max. 10")	<input type="checkbox"/>	-55		
5 startbeademingen	Correcte positionering masker en ballon met één-hand-techniek	<input type="checkbox"/>	-5	(-5 punten per onderdeel en per keer dat dit fout werd toegepast)	
	Hoofd in neutrale positie (sniffing position) - kinlift	<input type="checkbox"/>	-5		
	Correcte duur (rustig, 1") – 5 beademingen in totaal	<input type="checkbox"/>	-5		
	Correct volume (de borstkas zet uit)	<input type="checkbox"/>	-5		
Controle tekenen van leven	Controle tekenen van leven (ademen, bewegen, geluiden) Max. 10" – sniffing position wordt behouden	<input type="checkbox"/>	-5*	*: -5 punten indien te kort of te lang gecontroleerd -20 punten indien niet gecontroleerd	
Bevestiging MUG	Feedback met H/A B (reanimatie baby)	<input type="checkbox"/>	-20*		
Bevestiging MUG	Feedback met H/A B (reanimatie baby)	<input type="checkbox"/>	-5		
HULPVERLENER/AMBULANCIER A (= kandidaat)				HULPVERLENER/AMBULANCIER B (= examiner)	
Borstcompressies	Twee-vinger of tweeduimsmethode			<u>Gebruik maken van QCPR:</u>	
	Plaatsing: onderste helft van het borstbeen	<input type="checkbox"/>	-5	**: -5 per cyclus, -20 na 3 cycli, -60 na 4 cycli ***: -5 per cyclus bij ritme tussen 80 - 100 of tussen 120 - 140 zit -20 per cyclus als het ritme onder de 80 of boven de 140 zit	
	Correcte houding – vingers worden niet verplaatst	<input type="checkbox"/>	-5		
	Borstkas wordt 1/3 ingedrukt (4 cm)	<input type="checkbox"/>	-5**		
	Borstkas voldoende laten ontspannen	<input type="checkbox"/>	-5**		
	Frequentie van min. 100 tot max. 120/minuut	<input type="checkbox"/>	-5*** -20***		
				2 beademingen	
Borstcompressies	Twee-vinger of tweeduimsmethode			<u>Gebruik maken van QCPR:</u>	
	Plaatsing: onderste helft van het borstbeen	<input type="checkbox"/>	-5	**: -5 per cyclus, -20 na 3 cycli, -60 na 4 cycli ***: -5 per cyclus bij ritme tussen 80 - 100 of tussen 120 - 140 zit -20 per cyclus als het ritme onder de 80 of boven de 140 zit	
	Correcte houding – vingers worden niet verplaatst	<input type="checkbox"/>	-5		
	Borstkas wordt 1/3 ingedrukt (4 cm)	<input type="checkbox"/>	-5**		
	Borstkas voldoende laten ontspannen	<input type="checkbox"/>	-5**		
	Frequentie van min. 100 tot max. 120/minuut	<input type="checkbox"/>	-5*** -20***		
				2 beademingen	
Borstcompressies	Twee-vinger of tweeduimsmethode			<u>Gebruik maken van QCPR:</u>	
	Plaatsing: onderste helft van het borstbeen	<input type="checkbox"/>	-5	**: -5 per cyclus, -20 na 3 cycli, -60 na 4 cycli ***: -5 per cyclus bij ritme tussen 80 - 100 of tussen 120 - 140 zit -20 per cyclus als het ritme onder de 80 of boven de 140 zit	
	Correcte houding – vingers worden niet verplaatst	<input type="checkbox"/>	-5		
	Borstkas wordt 1/3 ingedrukt (4 cm)	<input type="checkbox"/>	-5**		
	Borstkas voldoende laten ontspannen	<input type="checkbox"/>	-5**		
	Frequentie van min. 100 tot max. 120/minuut	<input type="checkbox"/>	-5*** -20***		
				2 beademingen	
Borstcompressies	Twee-vinger of tweeduimsmethode			<u>Gebruik maken van QCPR:</u>	
	Plaatsing: onderste helft van het borstbeen	<input type="checkbox"/>	-5	**: -5 per cyclus, -20 na 3 cycli, -60 na 4 cycli ***: -5 per cyclus bij ritme tussen 80 - 100 of tussen 120 - 140 zit -20 per cyclus als het ritme onder de 80 of boven de 140 zit	
	Correcte houding – vingers worden niet verplaatst	<input type="checkbox"/>	-5		
	Borstkas wordt 1/3 ingedrukt (4 cm)	<input type="checkbox"/>	-5**		
	Borstkas voldoende laten ontspannen	<input type="checkbox"/>	-5**		
	Frequentie van min. 100 tot max. 120/minuut	<input type="checkbox"/>	-5*** -20***		
				2 beademingen	
Correct algoritme	15 borstcompressies worden afgewisseld met 2 beademingen	<input type="checkbox"/>	-20		
<b>Einde van de evaluatie na 4 cycli borstcompressies door kandidaat.</b>					

**Opmerkingen:**

**Resultaat:** GESLAAGD | NIET GESLAAGD  
**PUNTEN:** \_\_\_\_/100 = \_\_\_\_/50

**Naam en handtekening evaluatoren:**

## EVALUATIEFORMULIER REANIMATIE VAN EEN VOLWASSEN PERSOON

### DOOR EEN HULPVERLER/AMBULANCIER (BRC 2015)

Setting 1: HULPVERLENER/AMBULANCIER B (= kandidaat)				Score	Setting 2: HULPVERLENER/AMBULANCIER A (= examiner)	
Oproep MUG	Op vraag van H/A B MUG bijvragen voor een reanimatie (meegeven: toestand SO, leeftijd, geslacht, plaats)	<input type="checkbox"/>	-5	Docent schetst de situatie, beschrijft dat er een ademhalingsstilstand is vastgesteld en dat het AED toestel moet worden aangelegd. Hij vraagt om een MUG via Astrid op te roepen.  Hij dient zelf borstcompressies toe.		
AED aanleggen en bedienen	AED zonder tijdverlies aanschakelen	<input type="checkbox"/>	-20			
	Elektroden correct plaatsen en goed vasthechten (rechts niet op het sleutelbeen en niet op de tepel links 1 hand onder de oksel, niet op het borstbeen)	<input type="checkbox"/>	-20			
	Patiënt niet aanraken tijdens analyse (door u en anderen)	<input type="checkbox"/>	-20			
	Instructies van de AED correct opvolgen	<input type="checkbox"/>	-20			
	Verbale en visuele controle voor shock	<input type="checkbox"/>	-20			
Shock zonder uitstel toedienen	<input type="checkbox"/>	-20				
Shock veilig toedienen   Patiënt niet aanraken (afstand min. 10 cm)	<input type="checkbox"/>	-55				
Setting 2: HULPVERLENER/AMBULANCIER A (= kandidaat)					Setting 2: HULPVERLENER/AMBULANCIER B (= examiner)	
Zorg voor veiligheid	Toont zorg voor veiligheid	<input type="checkbox"/>	-5			
Controle bewustzijn	Luid aanspreken – zachtjes schouders schudden	<input type="checkbox"/>	-5			
Bevestiging MUG	Feedback met H/A B (bewusteloos slachtoffer)	<input type="checkbox"/>				Bevestigt dat MUG onderweg is
Vrije luchtweg	Hoofd kantelen – kinlift	<input type="checkbox"/>	-20			
Controle ademhaling	Kijken – voelen – luisteren (min. 5", max. 10")	<input type="checkbox"/>	-55			
Bevestiging reanimatie	Feedback met H/A B (melding reanimatie)	<input type="checkbox"/>	-20			Ten laatste hier moet MUG bijgevraagd zijn!
Borstcompressies	Handen in het midden van de borstkas	<input type="checkbox"/>	-5*			Aanleggen AED en juiste instructies
	Correcte houding – handen worden niet verplaatst	<input type="checkbox"/>	-5**			<u>Gebruik maken van QCPR:</u>
	Borstkas wordt min. 5 cm, max. 6 cm ingeduwd	<input type="checkbox"/>	-5**			*: -5 per cyclus
	Borstkas voldoende laten ontspannen	<input type="checkbox"/>	-5**			** : -5 per cyclus, -20 na 3 cycli, -60 na 4 cycli
	Frequentie van min. 100 tot max. 120/ minuut	<input type="checkbox"/>	-5*** -20***			***: -5 per cyclus bij ritme tussen 80 - 100 of tussen 120 - 140 zit -20 per cyclus als het ritme onder de 80 of boven de 140 zit
					Toedienen shock	
Wissel na shock					Wissel na shock	
				Borstcompressies	Handen in het midden van de borstkas Correcte houding – handen worden niet verplaatst	
					Borstkas wordt min. 5 cm, max. 6 cm ingeduwd Borstkas voldoende laten ontspannen	
					Frequentie van min. 100 tot max. 120/ minuut	
Masker & ballon beademing	Masker en ballon klaarmaken – aansluiten op zuurstof Met twee-handen-techniek correct plaatsen Hoofd kantelen - kinlift	<input type="checkbox"/>	-5	Beademing	De beademingsballon wordt 2x na elkaar op een rustige en correcte manier (de borstkas komt omhoog, er wordt niet te veel lucht ingeblazen) ingedrukt en voldoende losgelaten.	
Wissel tijdens analyse AED					Wissel tijdens analyse AED	
Borstcompressies	Handen in het midden van de borstkas	<input type="checkbox"/>	-5*			<u>Gebruik maken van QCPR:</u>
	Correcte houding – handen worden niet verplaatst	<input type="checkbox"/>	-5**			*: -5 per cyclus
	Borstkas wordt min. 5 cm, max. 6 cm ingeduwd	<input type="checkbox"/>	-5**			** : -5 per cyclus, -20 na 3 cycli, -60 na 4 cycli
	Borstkas voldoende laten ontspannen	<input type="checkbox"/>	-5**			***: -5 per cyclus bij ritme tussen 80 - 100 of tussen 120 - 140 zit -20 per cyclus als het ritme onder de 80 of boven de 140 zit
Beademing	Frequentie van min. 100 tot max. 120/ minuut	<input type="checkbox"/>	-5*** -20***			Masker met twee-handen-techniek correct plaatsen
Wissel tijdens analyse AED					Wissel tijdens analyse AED	
				Borstcompressies	Handen in het midden van de borstkas Correcte houding – handen worden niet verplaatst	
					Borstkas wordt min. 5 cm, max. 6 cm ingeduwd Borstkas voldoende laten ontspannen	
					Frequentie van min. 100 tot max. 120/ minuut	
Masker & ballon beademing	Masker en ballon klaarhouden Met twee-handen-techniek correct plaatsen Hoofd kantelen - kinlift	<input type="checkbox"/>	-20	Beademing	De beademingsballon wordt 2x na elkaar op een rustige en correcte manier ingedrukt en voldoende losgelaten	
Correct algoritme	30 borstcompressies worden afgewisseld met 2 beademingen	<input type="checkbox"/>	-20			
<b>Einde van de evaluatie wanneer alle deelvaardigheden zijn uitgevoerd en geëvalueerd.</b>						

**Opmerkingen:**

**Resultaat:** GESLAAGD | NIET GESLAAGD

**Naam en handtekening evaluatoren:**

\_\_\_\_\_/100 = \_\_\_\_\_/50